

## Concours Général Maths 2024 Autour de l'exercice 2

### Les bonbons cachés

*Éléments de correction de ce problème, à l'exception de la partie 3. Je ne suis pas en mesure de proposer une piste de résolution consistante de cette partie.*

Partie 1 : Sophie et Germain testent les trois boîtes.

1. Notons  $B$  l'évènement « Sophie choisit la boîte contenant les bonbons » et  $\bar{B}$  son évènement contraire : « Sophie choisit une des deux boîtes n'en contenant pas ».

Vu qu'il y a équiprobabilité du choix de chacune des trois boîtes :  $P(B) = \frac{1}{3}$

2.a. Si Sophie ne modifie pas son choix, le jeu précédent n'est pas modifié.  $P(B) = \frac{1}{3}$

2.b. Supposons que Sophie modifie son choix et change sa boîte. Notons  $B_1$  l'évènement « Sophie choisit au premier tour la boîte contenant les bonbons », évènement dont la probabilité est égale à  $\frac{1}{3}$  d'après la question précédente, et  $B$  l'évènement « Sophie choisit la boîte contenant les bonbons à l'issue du jeu »

Nous avons :  $P_{B_1}(B) = 0$  car si  $B_1$  est réalisé, au second tour Sophie échange la boîte gagnante contre une vide et  $P_{\bar{B}_1}(B) = 1$  car si  $B_1$  n'est pas réalisé, au second tour Sophie échange sa boîte vide contre la boîte gagnante, l'autre boîte vide étant éliminée.

$$\text{Dans ce protocole : } P(B) = P(B_1) \times P_{B_1}(B) + P(\bar{B}_1) \times P_{\bar{B}_1}(B) = \frac{1}{3} \times 0 + \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$$

2.c. Le second protocole est plus avantageux pour Sophie puisqu'elle double ses chances de gagner.

### Partie 2 : Une stratégie pour Sophie

On reprend la notation  $B_1$  de la partie 1.

**3.a.** Vu qu'il y a équiprobabilité du choix de chacune des  $n$  boîtes :  $P(B_1) = \frac{1}{n}$ .

**3.b.** Si Sophie ne modifie pas son choix :  $P(B) = P(B_1) = \frac{1}{n}$  car le second tour n'a aucune influence.

Si Sophie modifie son choix, il ne reste que deux boîtes au second tour. Nous avons toujours  $P_{B_1}(B) = 0$  et

$$P_{\overline{B_1}}(B) = 1. \text{ Dans ce protocole : } P(B) = P(B_1) \times P_{B_1}(B) + P(\overline{B_1}) \times P_{\overline{B_1}}(B) = \frac{1}{n} \times 0 + \frac{n-1}{n} \times 1 = \frac{n-1}{n}$$

Pour tout entier  $n \geq 3$ , l'inégalité  $\frac{n-1}{n} > \frac{1}{n}$  est vérifiée.

**Sophie a toujours intérêt à modifier son choix.**

**4.a.** Si Sophie ne modifie pas son choix :  $P(B) = P(B_1) = \frac{1}{n}$  car les tours suivants n'ont aucune influence.

**4.b.** Si Sophie conserve son choix à chaque tour sauf au dernier où elle change son choix, ce protocole revient à éliminer  $(n - 2)$  boîtes vides successivement. Il est équivalent au protocole de la question **3.b**. La probabilité de gagner est la même qu'en **3.b**.

**En gardant toujours la même boîte jusqu'au dernier tour (où elle l'échange) Sophie s'assure de gagner avec une probabilité exactement égale à  $\frac{n-1}{n}$ .**

### Partie 3 : Une stratégie pour Germain

?

5

### Partie 4 : Une stratégie commune

Je propose une méthode basée sur des congruences et cousine du « théorème chinois », méthode permettant de déterminer le numéro de la boîte contenant les bonbons sans pour autant le « communiquer ».

On choisit deux nombres premiers  $p$  et  $q$  distincts et supérieurs ou égaux à 3 et on pose  $n = p \times q$

Les entiers de 1 à  $n = p \times q$  sont caractérisés par leurs restes dans les divisions euclidiennes par  $p$  et par  $q$ .

Sophie choisit la boîte numéro  $n$  et la garde jusqu'à connaître le numéro de la boîte contenant les bonbons.

En éliminant seulement deux boîtes, Germain peut arriver à coder le numéro  $b$  de la boîte où se trouvent les bonbons :

- La première boîte porte un numéro congru à  $b$  modulo  $p$
- La deuxième boîte porte un numéro congru à  $b$  modulo  $q$

Ci-dessous un algorithme Python et son application avec  $p = 3 ; q = 5$ . On constate que cet algorithme fonctionne non seulement pour  $n = 3 \times 5 = 15$  mais aussi pour les valeurs de  $n$  telles que  $11 \leq n \leq 15$ .

On pourrait vérifier qu'avec  $p = 5 ; q = 7$  l'algorithme fonctionne pour  $15 \leq n \leq 35$  et qu'avec  $p = 7 ; q = 13$  l'algorithme fonctionne pour  $27 \leq n \leq 91$

```
>>> def bonbons(p, q):
    for b in range(1, p*q+1):
        i=1
        while i%p!=b%p:
            i=i+1
        if i==b:
            i=i+p
        j=1
        while j%q!=b%q:
            j=j+1
        if j==i or j==b:
            j=j+q
        print("si bonbons dans", b, "restes", b%p, "et", b%q,
              "Germain enlève la boîte", i, "puis la boîte", j)

>>> bonbons(3, 5)
si bonbons dans 1 restes 1 et 1 Germain enlève la boîte 4 puis la boîte 6
si bonbons dans 2 restes 2 et 2 Germain enlève la boîte 5 puis la boîte 7
si bonbons dans 3 restes 0 et 3 Germain enlève la boîte 6 puis la boîte 8
si bonbons dans 4 restes 1 et 4 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 9
si bonbons dans 5 restes 2 et 0 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 10
si bonbons dans 6 restes 0 et 1 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 1
si bonbons dans 7 restes 1 et 2 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 2
si bonbons dans 8 restes 2 et 3 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 3
si bonbons dans 9 restes 0 et 4 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 4
si bonbons dans 10 restes 1 et 0 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 5
si bonbons dans 11 restes 2 et 1 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 1
si bonbons dans 12 restes 0 et 2 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 2
si bonbons dans 13 restes 1 et 3 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 3
si bonbons dans 14 restes 2 et 4 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 4
si bonbons dans 15 restes 0 et 0 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 5
```

## Concours Général 2024

Avec  $p = 3$  ;  $q = 7$ , l'algorithme fonctionne pour  $15 \leq n \leq 21$  :

```
>>> bonbons(3, 7)
si bonbons dans 1 restes 1 et 1 Germain enlève la boîte 4 puis la boîte 8
si bonbons dans 2 restes 2 et 2 Germain enlève la boîte 5 puis la boîte 9
si bonbons dans 3 restes 0 et 3 Germain enlève la boîte 6 puis la boîte 10
si bonbons dans 4 restes 1 et 4 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 11
si bonbons dans 5 restes 2 et 5 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 12
si bonbons dans 6 restes 0 et 6 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 13
si bonbons dans 7 restes 1 et 0 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 14
si bonbons dans 8 restes 2 et 1 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 1
si bonbons dans 9 restes 0 et 2 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 2
si bonbons dans 10 restes 1 et 3 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 3
si bonbons dans 11 restes 2 et 4 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 4
si bonbons dans 12 restes 0 et 5 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 5
si bonbons dans 13 restes 1 et 6 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 6
si bonbons dans 14 restes 2 et 0 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 7
si bonbons dans 15 restes 0 et 1 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 1
si bonbons dans 16 restes 1 et 2 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 2
si bonbons dans 17 restes 2 et 3 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 3
si bonbons dans 18 restes 0 et 4 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 4
si bonbons dans 19 restes 1 et 5 Germain enlève la boîte 1 puis la boîte 5
si bonbons dans 20 restes 2 et 6 Germain enlève la boîte 2 puis la boîte 6
si bonbons dans 21 restes 0 et 0 Germain enlève la boîte 3 puis la boîte 7
```

On peut faire mieux :

*Solution proposée par N.I.E. (élève de Terminale et participant au concours 2024) :*

Pour tout  $n \geq 4$  :

- Sophie choisit la boîte 4. Si c'est la bonne, Germain ôte la boîte 1, sinon il ôte une des boîtes 2 ou 3 (il en faut deux au cas où une des deux serait la bonne).
- Si Sophie a la boîte correcte elle la garde jusqu'à la fin, et sinon elle garde sa "mauvaise boîte" et l'échange au dernier tour avec la bonne.